SoluPlant®
Soluciones para sus Plantas!

Alabama

20 AÑOS
"Sembrando el Futuro"

Cinamite®

SOLUCIÓN LÍQUIDA DE ZINC PARA APLICACIÓN FOLIAR

EFECTO FORTIFICANTE Y PROTECTOR DE LAS PLANTAS

COMPOSICIÓN (% P/P):
Zinc soluble (Zn): 3,0
Coadyuvantes de origen vegetal: 13,0
Densidad: 1,01 g/cc
pH: 7,0

LÍQUIDO SOLUBLE (SL)

AGRICULTURA ECOLÓGICA:
Insumo reconocido por **AGROCOLOR**

ABONO CE (Conforme al Reg. CE nº 2003/2003)

No contiene organismos genéticamente modificados (OGM´s)
Exento de residuos, plazos de seguridad y de LMR's

Producto SIN Residuos

INSUMO RECONOCIDO PARA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
agrocolor

Blue Heron
Plant BioDynamics

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN

Cinamite® es un fertilizante especial de aplicación foliar conteniendo Zinc soluble (como Zn^{2+}) y coadyuvantes y tensioactivos naturales de origen vegetal, que mejoran su eficacia, sus propiedades mojantes y su aplicación, a la vez que potencian su asimilación por los cultivos. El empleo regular de **Cinamite®** previene y corrige sistemáticamente las carencias de este nutriente esencial, de baja movilidad en las plantas, pero involucrado en la activación enzimática y hormonal del metabolismo primario (biosíntesis aminoacídica y auxínica del ácido β indol-acético, etc.).

Además, por su especial formulación y sus propiedades mojantes - adherentes, genera un efecto fortificante que ayuda a recuperar los cultivos de los daños causados por ataques de ácaros (*P. citri*, *T. urticae* y otros tetraníquidos) y eriófidos (*A. lycopersici*, *Vasates* sp. etc.) y algunos insectos (ninfas de pulgones, moscas blancas y trips).

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

El empleo de **Cinamite®** está indicado para su empleo por vía foliar en plantaciones agrícolas, forestales, y en el ámbito profesional de parques y jardines. Entre otros, tiene utilidad en los siguientes cultivos: Cítricos, Vid y Parral, Frutales de hoja caduca (de hueso, de pepita,...) y tropicales (aguacatero, mango, chirimoyo, caqui, platanera, etc.), fresales, frambuesos y bayas y pequeños frutos y cultivos hortícolas tanto al aire libre como en invernadero (tomate, pimiento, cucurbitáceas, ajo, lechugas, judía verde, etc.), plantaciones de ornamentales y flor cortada (claveles, rosales, etc.) y en parques y jardines, cultivos industriales (maíz, lúpulo, adormidera, algodonero, etc.), como fertilizante para aportar Zinc o corregir carencias del mismo, y como fortificante de las plantas frente a las agresiones y el estrés causado por plagas de ácaros, eriófidos y otros. Posee un efecto potenciador de los tratamientos acaricidas e insecticidas. Muy compatible con la fauna auxiliar.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal foliar de medio y alto volumen, con un gasto de caldo suficiente para realizar una buena cobertura de toda la planta. Emplear **Cinamite®** de 150 a 250 ml/100 L de agua (mínimo 1,5 L/Ha). En caso de persistir el problema en plantas con carencias, muy decaídas o debilitadas, repetir la aplicación a los 7-10 días.

Procurar aplicar en las horas de menor insolación, preferentemente al atardecer o al amanecer, evitando las horas centrales del día y las altas temperaturas.

COMPATIBILIDAD EN MEZCLAS

Cinamite® es compatible con la mayoría de productos agroquímicos de uso común. En vegetación, no mezclar con productos que contengan aceites y cobres elementales. Puede mezclarse con azufres mojables de alta calidad, evitando las horas de mayor insolación y elevadas temperaturas. Compatible con insecticidas y acaricidas. Se recomienda su mezcla con **Yoda®** o **Avenger®** para mejorar su acción.

UTILIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

Cinamite® puede ser incluido en programas de Manejo Integrado de plagas, en cualquier sistema productivo y de certificación de la calidad (GlobalGap, P. Integrada, P. Controlada, A. Ecológica, etc.), y en agricultura convencional. Es una buena herramienta para incorporar a programas de manejo de resistencias a acaricidas e insecticidas.

COMPATIBILIDAD CON LA FAUNA AUXILIAR

Cinamite® es compatible con la mayoría de insectos parasitoides y artrópodos e insectos depredadores (incluido *A. swirskii*), si bien, se recomienda que las sueltas se realicen pasadas al menos 24 después de realizada la pulverización con **Cinamite®**. Se recomienda mantener las colmenas de abejas y abejorros cerradas durante 12-24 H para evitar el contacto directo de los polinizadores con el caldo con producto fresco.

Av. Oscar R. Benavides, N°5737 - Callao
Tef: (51)464 6347
tienda@alabama.com.pe
www.alabama.com.pe
Importado desde Madrid - España